

Схема применения лекарственного препарата

ПИКАМИЛОН®

 оригинальный отечественный ноотроп для улучшения состояния сосудов головного мозга



РЕЦЕПТУРНЫЙ ПРЕПАРАТ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ДОПУСКАЕТСЯ СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТА.
ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ И ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

ПОКАЗАНИЯ	ФОРМА	CXEMA
Цереброваскулярные заболевания	Таблетки	20-50 мг 2-3 раза в день Курс лечения 1-2 месяца
	Раствор для приема внутрь	5 мл -12,5 мл 2-3 раза в день Курс лечения 1-2 месяца
	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*	100-200 мг 1 раз в день – 10 дней внутривенно, затем внутримышечно Курс лечения 15-30 дней
Первичная открытоугольная глаукома	Таблетки	50 мг 3 раза в день Курс лечения 1 месяц
	Раствор для приема внутрь	По 12,5 мл 3 раза в день Курс лечения 1 месяц
	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*	100-200 мг в день 10 дней
Заболевания сетчатки и зрительного нерва	Таблетки	Первые 12 дней вводят внутримышечно, затем в зависимости от состояния внутрь по 20-50 мг 3 раза в день 1 месяц
	Раствор для приема внутрь	Первые 12 дней вводят внутримышечно, затем в зависимости от состояния внутрь по 5-12,5 мл 3 раза в день 1 месяц
	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*	

^{*}Способ применения указан в инструкции по медицинскому применению Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Пикамилон®



РЕЦЕПТУРНЫЙ ПРЕПАРАТ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ДОПУСКАЕТСЯ СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТА.

ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ И ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

2

ПОКАЗАНИЯ	ФОРМА	CXEMA	
Для восстановления работоспособности и при повышенных нагрузках	Таблетки	60-80 мг в день 1-1,5 месяца Для спортсменов в той же дозе, в течение 2 недель тренировочного периода	
	Раствор для приема внутрь	15-20 мл в день 1-1,5 месяца Для спортсменов в той же дозе, в течение 2 недель тренировочного периода	
	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*	200 мг в день 10-15 дней Для спортсменов в той же дозе, в течение 2 недель тренировочного периода	
Депрессивные состояния пожилого возраста	Таблетки	60-120 мг в день за 2-3 приема 1,5-3 месяца	
	Раствор для приема внутрь	15-30 мл в день за 2-3 приема 1,5-3 месяца	
	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*	50-200 мг в день 10-15 дней	
Профилактика приступов мигрени	Таблетки	50 мг 3 раза в день Для купирования приступа – 100 мг однократно	
	Раствор для приема внутрь	По 12,5 мл 3 раза в день мах разовая доза – 12,5 мл мах суточная доза - 37,5 мл	
	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*		

^{*}Способ применения указан в инструкции по медицинскому применению Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Пикамилон®



ПОКАЗАНИЯ	BO3PACT	ФОРМА	CXEMA
Лечение расстройств мочеиспускания	от 3 до 10 лет	Таблетки	20 мг 2 раз в день 1 месяц
		Раствор для приема внутрь	5 мл 2 раз в день 1 месяц
		Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*	100 мг в день
	от 11 до 15 лет	Таблетки	50 мг 2 раз в день 1 месяц
		Раствор для приема внутрь	12,5 мл 2 раз в день 1 месяц
		Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*	200 мг в день
	старше 15 лет	Таблетки	50 мг 3 раз в день 1 месяц
		Раствор для приема внутрь	12,5 мл 3 раз в день 1 месяц
		Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*	200 мг в день
В качестве астенического и анксиолитического средства	Таблетки		40-80 мг в день, при необходимости до 200-300 мг в день 1-1,5 месяца
	Раствор для приема внутрь		10-20 мл в день при необходимости до 50-75 мл в день 1-1,5 месяца
В комплексной терапии синдрома вегетативной дистонии	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*		100-200 мг в день 10-15 дней

^{*}Способ применения указан в инструкции по медицинскому применению Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Пикамилон®



ПОКАЗАНИЯ	ФОРМА	CXEMA
Алкоголизм в период абстиненции	Таблетки	100-150 мг в день 6-7 дней При более стойких нарушениях вне абстиненции 40-60 мг в день 4-5 недель
	Раствор для приема внутрь	25-37,5 мл в день 6-7 дней При более стойких нарушениях вне абстиненции 10-5 мл в день 4-5 недель
	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения*	100 мг в день 6-15 дней



^{*}Способ применения указан в инструкции по медицинскому применению Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Пикамилон®